

SLOW-MAG B6, 50 tabletek



cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	ETHIFARM
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	uzupełnienie magnezu

Opis produktu

SLOW-MAG B6 - działanie:

magnez i witamina B6 są niezbędne w procesie syntezy enzymatycznej białek, oddziałują w wielu procesach fizjologicznych, co w efekcie wywołuje działanie stabilizujące układ nerwowy, uspakajające, usuwające zmęczenie mięśni, chroniące układ sercowo-naczyniowy i wątrobę. Odgrywają także ważną rolę w procesach odpornościowych i krwiotwórczych. Działają antystresowo dzięki magnezowi, który przywraca właściwe stosunki jonowe w komórkach ośrodkowego układu nerwowego. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu oraz zmniejszenia jego wydalanie z moczem.

SLOW-MAG B6 - wskazania:

Bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany zmęczenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza

SLOW-MAG B6 - skład:

1 tabletkę zawiera 64 mg jonów magnezu (Magnesium) w postaci magnezu chlorku sześciowodnego oraz 5 mg witaminy B6 w postaci pirydoksyny chlorowodoru; substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian; skład otoczek: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutyłu sebacynian, talk

SLOW-MAG B6 - dawkowanie:

dorośli - profilaktycznie 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem; w niedoborze magnezu i witaminy B6 5 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem. Dzieci powyżej 12 lat – w terapii krótkotrwałej, maksymalnie do

3 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.

SLOW-MAG B6 - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia), znaczne niedociśnienie tętnicze, zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego, niewydolność nerek, Myasthenia gravis; nie stosować równocześnie z lewodopą

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.