

TADALAFIL MAXIGRA 10 mg, 2 tabletki



cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	zaburzenia erekcji

Opis produktu

Tadalafil Maxigra jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

TADALAFIL MAXIGRA - działanie:

lek pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwi napływ krwi do członka, dochodzi wtedy do poprawy erekcji. Lek nie działa przy braku stymulacji seksualnej.

TADALAFIL MAXIGRA - wskazania:

do stosowania u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji

TADALAFIL MAXIGRA - skład:

substancją czynną leku jest tadalafil. 1 tabletki zawiera 10 mg tadalafilu, pozostałe składniki: rdzeń tabletki - laktoza jednowodna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian, otoczka tabletki - alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza, tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172)

TADALAFIL MAXIGRA - dawkowanie:

zażyć 30 minut przed aktywnością seksualną, popijając niewielką ilością wody. Nie należy przyjmować leku częściej niż raz w tygodniu.

TADALAFIL MAXIGRA - przeciwwskazania:

- uczulenie na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

- przyjmowanie leków zawierających azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiegokolwiek leki z tej grupy. Do grupy azotanów należą następujące leki: nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) - np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran; monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) - np. Effox, Isosorbide mononitrate, Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard; diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) - np. Sorbonit, tetraazotan pentaerytroli (Pentaerythryli tetranitras) - np. Galpent, Pentaerythritol compositum. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Wykazano, że lek Tadalafil Maxigra nasila działanie tych leków. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- przyjmowanie leków lub innych środków uwalniających tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego
- ciężka choroba serca lub przebyte zawału serca w ciągu ostatnich 90 dni
- przebyte udaru w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- występowanie niskiego ciśnienia krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi
- stwierdzenie kiedykolwiek epizodu utraty wzroku w wyniku nietętnicznej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określanej jako „porażenie oka”
- przyjmowanie riocyguatu (np. Adempas). Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jak Tadalafil Maxigra, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, powinien poinformować o tym lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.