

TADALAFIL MENSIL 10 mg, 2 tabletki

cena: 21,49 PLN



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	HASCO-LEK
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	zaburzenia erekcji

Opis produktu

TADALAFIL MENSIL 10 mg - działanie:

po stymulacji seksualnej, lek pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwi napływ krwi do członka. W rezultacie dochodzi do poprawy erekcji. Lek nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Nie działa przy braku stymulacji seksualnej.

TADALAFIL MENSIL 10 mg - wskazania:

zaburzenia erekcji

TADALAFIL MENSIL 10 mg - skład:

jedna tabletkę zawiera 10 mg tadalafilu; pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian; otoczka Opadry II Blue 85F30605: alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350 i 4000, talk, indygokarmin, lak alumiiniowy (E 132)

TADALAFIL MENSIL 10 mg - dawkowanie:

- zalecana dawka to jedna tabletkę 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.
- przyjmując przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną
- lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki

TADALAFIL MENSIL jest przeznaczony do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną. Lek należy stosować doraźnie, w miarę potrzeby. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu. Nie przyjmować więcej niż 1 tabletkę.

TADALAFIL MENSIL 10 mg - przeciwwskazania:

- uczulenie na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- przyjmowanie azotanów organicznych w jakiegokolwiek postaci lub innych donorów tlenu azotu, np. azotynu amylu. Jest to grupa leków („azotany”) stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Wykazano, że tadalafil nasila działanie tych leków. Jeżeli pacjent zażywa azotany w jakiegokolwiek postaci lub nie jest tego pewien, powinien poinformować o tym lekarza.
- zalecone przez lekarza unikanie aktywności seksualnej
- występowanie ciężkiej choroby serca lub przebycie zawału serca w ciągu ostatnich 90 dni
- przebycie udaru w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi, lub niekontrolowane zaburzenia rytmu serca
- stwierdzona kiedykolwiek utrata wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określanej jako „porażenie oka”
- przyjmowanie riocycuatu - jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak tadalafil, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocycuat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.