

# TANTUM ROSA 53,2 mg/g, proszek do sporządzania roztworu dopochwowego, 10 saszetek



cena: 22,99 PLN

## Opis słownikowy

Postać	proszek do sporządzania roztworu
Producent	ANGELINI
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	w stanach zapalnych dróg rodnych

## Opis produktu

### TANTUM ROSA 53,2 mg/g - działanie:

przeciwzapalne, przeciwbólowe, miejscowo znieczulające oraz odkażające

### TANTUM ROSA 53,2 mg/g - wskazania:

leczenie dolegliwości i objawów (ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie, obrzęk) w przebiegu zapalenia sromu i pochwy, w przebiegu zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia, po chemio- i radioterapii, w profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii, w połogu

### TANTUM ROSA 53,2 mg/g - skład:

1 g proszku zawiera 53,2 mg/g benzydaminu chlorowodoru (Benzydaminu hydrochloridum); 1 saszетка (9,4 g) zawiera 500 mg benzydaminu chlorowodoru; składniki pomocnicze: sodu chlorek, powidon, p-toluenosulfonian trójmetylocetyloamoniowy

### TANTUM ROSA 53,2 mg/g - dawkowanie:

od 1 do 2 saszetek w ciągu doby, w zależności od nasilenia dolegliwości; zawartość jednej saszетки rozpuścić w 0,5 litra przegotowanej i ostudzonej wody, bezpośrednio przed zastosowaniem. Każdorazowo należy przygotować nowy roztwór z jednej saszетки (np. rano i wieczorem). W przypadku samodzielnego rozpoczęcia leczenia nie należy nieprzerwanie stosować leku dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz. W celu uzyskania poprawy, leczenie nie powinno trwać krócej niż 3 dni. W celu właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia płukania pochwy (irygacji), należy zapoznać się z instrukcją użycia dołączoną do irygatora do higieny intymnej, dostępnego w aptekach bez recepty

### TANTUM ROSA 53,2 mg/g - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.