

THERAFLU EXTRA GRIP o smaku cytrynowym, 14 saszetek



cena: 23,42 PLN

Opis słownikowy

Marka	Theraflu
Postać	proszek w saszetkach
Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

Theraflu
Extra Grip

14
saszetek

Opis produktu

THERAFLU EXTRA GRIP - działanie:

przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, łagodzi objawy uczuleniowe, takie jak: kichanie, świąd lub przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok

THERAFLU EXTRA GRIP - wskazania:

leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie

THERAFLU EXTRA GRIP - skład:

substancjami czynnymi leku są: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg; inne substancje: sacharoza, acesulfam potasowy, żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa, maltodekstryna M100, krzemionka koloidalna uwodniona, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan

THERAFLU EXTRA GRIP - dawkowanie:

dorośli i młodzież powyżej 12 lat - zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej, ale nie wrzącej wody, wypić po wystygnięciu do odpowiedniej temperatury. Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Nie stosować więcej niż 3-4 saszetki w ciągu doby.

THERAFLU EXTRAGRIP - przeciwwskazania:

nadwrażliwość (alergia) na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny i maleinian feniraminy lub inne składniki tego leku; choroba serca lub podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze); nadczynność tarczycy; jaskra z zamkniętym kątem przesączania (zwiększone ciśnienie w oku); guz chromochłonny nadnerczy (rodzaj guza nadnerczy - gruczołów położonych blisko nerek); przyjmowanie obecnie lub przyjmowanie w ciągu ostatnich 14 dni inhibitorów monoaminoooksydazy (inhibitory IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona); przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych; przyjmowanie beta-adrenolityków (leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca); przyjmowanie innych leków sympatykomimetycznych, takich jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy; ciąża i karmienie piersią; nie stosować u dzieci poniżej 12 lat

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.