

THERAFLU ZATOKI, 14 saszetek

cena: 28,99 PLN



Opis słownikowy

Marka	Theraflu
Postać	proszek w saszetkach
Problem	ból zatok, przeziębienie
Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	łagodzenie bólu głowy, odblokowanie zatkanego nosa, przeciwgorączkowe

Opis produktu

THERAFLU ZATOKI - działanie:

udrażnia nos i zatoki, zmniejsza ból głowy i zatok, działa przeciwgorączkowo, łagodzi objawy przeziębienia i grypy

THERAFLU ZATOKI - wskazania:

leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok, takich jak: ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej

THERAFLU ZATOKI - skład:

substancjami czynnymi leku są: paracetamol 650 mg i chlorowodorek fenylefryny 10 mg; pozostałe składniki: sacharoza, acesulfam potasowy, żółcień chinolinowa E104, żółcień pomarańczowa, maltodekstryna M100, krzemionka koloidalna uwodniona, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan

THERAFLU ZATOKI - dawkowanie:

dorośli i młodzież powyżej 12 lat - zawartość jednej saszetki rozpuścić w 1 szklance gorącej, ale nie wrzącej wody. Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. W ciągu doby można przyjąć zawartość 3-4 saszetek. Nie należy stosować dłużej niż 5 dni.

THERAFLU ZATOKI - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny lub inne składniki tego leku; aktualne przyjmowanie lub przyjmowanie w

ciągu ostatnich 14 dni inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory IMAO, leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona); ciężka choroba serca lub bardzo wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie); nadczynność tarczycy; jaskra z wąskim kątem przesączania (choroba oczu z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego i co najmniej częściowo związanej z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej); guz chromochłonny nadnerczy (guz zlokalizowany w pobliżu nerek, który powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego); przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych; przyjmowanie leków beta-adrenolitycznych (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca); przyjmowanie innych leków sympatykomimetycznych, takich jak do nosowe leki obkurczające błonę śluzową nosa, leki hamujące apetyt itp.; nie stosować u dzieci poniżej 12 lat, a także podczas ciąży i karmienia piersią

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.