

UNDOFEN AMOROLFINA leczniczy lakier do paznokci na grzybicę, 2,5 ml

cena: 62,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	lakier do paznokci
Producent	OMEGA PHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwgrzybicze

Opis produktu

Opakowanie zawiera: butelkę z lakierem do paznokci, 30 wacików, 30 pilniczków, 10 szpatulek

UNDOFEN AMOROLFINA leczniczy lakier do paznokci - działanie:

substancja czynna leku amorolfina działa na różnego rodzaju grzyby wywołujące grzybicę paznokci

UNDOFEN AMOROLFINA leczniczy lakier do paznokci - wskazania:

grzybicę paznokci wywołane przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie oraz ograniczone do dwóch paznokci oraz do górnych i bocznych części tych paznokci. Lek może być stosowany, gdy w wyniku grzybiczego zakażenia płytki paznokciowej wystąpiła zmiana koloru płytki paznokcia (przebarwienia koloru białego, żółtego lub brązowego) lub zgrubienie płytki

UNDOFEN AMOROLFINA leczniczy lakier do paznokci - skład:

1 mililitr lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodoru); pozostałe składniki: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol bezwodny

UNDOFEN AMOROLFINA leczniczy lakier do paznokci - sposób użycia:

nakładać na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp jeden raz w tygodniu. Przed pierwszym nałożeniem powierzchnię zakażonego paznokcia należy dokładnie spiliwać za pomocą pilniczka do paznokci, a następnie odtłuścić za pomocą dołączonego wacika, nasączonego alkoholem. Lakier należy nanieść szpatułką na całą powierzchnię zakażonego paznokcia lub paznokci. Po nałożeniu lakieru buteleczkę należy jak najszybciej szczelnie zamknąć. Pozostawić lakier do wyschnięcia na 3 do 5 minut. Szpatułkę po użyciu należy wyczyścić używając tego samego wacika, którym wcześniej czyszczona była płytka paznokcia

UNDOFEN AMOROLFINA leczniczy lakier do paznokci - przeciwwskazania:

uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.