


VALUSED, 30 kapsułek

cena: 18,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	HASCO-LEK
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	uspokajające

Opis produktu

VALUSED - działanie:

uspokajające i ułatwiające zasypianie

VALUSED - wskazania:

łagodzenie objawów w stanach napięcia nerwowego, takich jak: przyspieszone bicie serca pod wpływem zdenerwowania, nerwowość ruchów oraz drżenie rąk (trzęsące się dłonie), zaburzenia gastryczne na tle nerwowym, trudności w koncentracji na tle nerwowym; okresowe trudności w zasypianiu na tle nerwowym

VALUSED - skład:

substancjami czynnymi leku są: wyciąg suchy z korzenia kozłka, wyciąg suchy z szyszek chmielu, wyciąg suchy z ziela męczennicy. 1 kapsułka zawiera: 60 mg wyciągu suchego z korzenia kozłka (*Valeriana officinalis, radix*), w tym 99-100% wyciągu natywnego (DER 3-4:1), ekstrahent: etanol 60% V/V; 40 mg wyciągu suchego z szyszek chmielu (*Humulus lupulus, flos*), w tym 69,5-100% wyciągu natywnego (DER 5:1), ekstrahent: metanol 30% V/V; 40 mg wyciągu suchego z ziela męczennicy (*Passiflora incarnata, herba*), w tym 25-50% wyciągu natywnego (DER 2,7:1), ekstrahent: etanol 90% V/V; pozostałe składniki: krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, glukoza bezwodna, olej sojowy oczyszczony, lecytyna sojowa, olej kokosowy uwodorniony, olej palmowy rafinowany, воск żółty; składniki kapsułki żelatynowej: żelatyna wieprzowa, glicerol, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, dwutlenek tytanu (E 171), tlenek żelaza czarny (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172).

VALUSED - dawkowanie:

dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 kapsułki 2-3 razy na dobę; przy trudnościach w zasypianiu 2-3 kapsułki jednorazowo na pół godziny

przed snem

VALUSED - przeciwwskazania:

uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; nietolerancja waleriany; rzadko występująca dziedziczna nietolerancja fruktozy; stwierdzona nadwrażliwość na orzeszki ziemne albo soję

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.