

VIAGRA CONNECT MAX 50 mg, 2 tabletki

cena: 39,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	MYLAN
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	zaburzenia erekcji

Opis produktu

VIAGRA CONNECT MAX - działanie:

lek działa poprzez rozkurczenie naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając do niego napływ krwi podczas podniecenia seksualnego i wywołując erekcję. Lek pomaga osiągnąć erekcję jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

VIAGRA CONNECT MAX - wskazania:

do stosowania u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji

VIAGRA CONNECT MAX - skład:

1 tabletka zawiera 50 mg syldenafile (w postaci cytrynianu); pozostałe składniki to: rdzeń tabletki - celuloza mikrokryształiczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroscarmeloza sodowa i magnezu stearynian. Otoczka tabletki - hypromeloza, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna i indygotyna (E132).

VIAGRA CONNECT MAX - dawkowanie:

1 tabletkę należy przyjąć godzinę przed aktywnością seksualną, popijając niewielką ilością wody. Nie należy przyjmować w ciągu doby więcej niż 1 tabletkę.

VIAGRA CONNECT MAX 50 mg, 2 tabletki - przeciwwskazania:

- brak problemów z erekcją, gdyż lek ten nie będzie miał wówczas żadnego korzystnego działania
- przyjmowanie leków zwanych azotanami (nitrataми) w celu łagodzenia bólu w klatce piersiowej lub w leczeniu niewydolności

serca

- przyjmuje riocyguatu (lub innych leków pobudzających cyklazę guanylową), stosowanego w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi w płucach
- przyjmowanie rytonawiru stosowanego w leczeniu zakażenia wirusem HIV
- zalecone przez lekarza unikanie aktywności seksualnej, np. z powodu problemów z sercem lub naczyniami krwionośnymi
- ciężka choroba serca, taka jak: niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu (przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy), niestabilna dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej) lub ciężka niewydolność serca (zmniejszona zdolność serca do pompowania krwi)
- ciężka choroba wątroby
- niskie ciśnienie krwi (poniżej 90/50 mmHg), co może objawiać się zmęczeniem, zawrotami głowy, uczuciem pustki w głowie, wilgotną skórą, depresją, utratą koncentracji, niewyraźnym widzeniem
- wystąpienie kiedykolwiek poważnej utraty wzroku z powodu uszkodzenia nerwu wzrokowego, takiej jak przednia niedokrwienność neuropatia nerwu wzrokowego lub jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzoną chorobę oczu, taką jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
- występowanie deformacji anatomicznej prącia
- nie stosować u kobiet
- wiek poniżej 18 lat
- uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.