

VICKS VAPORUB maść, 50 g

cena: 21,49 PLN



Opis słownikowy

Postać	maść
Producent	WICK
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	łagodzenie objawów grypy, łagodzenie objawów przeziębienia

Opis produktu

VICKS VAPORUB maść - działanie:

- kamfora, olejek eukaliptusowy, lewomentol, olejek terpentynowy łagodzą dolegliwości górnych dróg oddechowych w katarze
- lewomentol i kamfora łagodzą obrzęk śluzówek małżowin nosowych oraz łagodzą kaszel poprzez działanie łagodnie znieczulające
- olejek eukaliptusowy i olejek terpentynowy działają pobudzająco na wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych, pobudzając odkrztuszanie

VICKS VAPORUB maść - wskazania:

w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania ("zatkanego nosa")

VICKS VAPORUB maść - skład:

substancjami czynnymi leku są: lewomentol (Levomentholum), kamfora racemiczna (Camphora racemica), olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum) i olejek terpentynowy (Terebinthini aetheroleum a Pino pinastro)

VICKS VAPORUB maść - sposób użycia:

maść do nacierania klatki piersiowej i pleców oraz do inhalacji poprzez parujące składniki lotne. Wcierać odpowiednią ilość maści we wskazane miejsca i powtarzać 2 do 3 razy na dobę, jeśli potrzeba. Parowaniu składników lotnych, a tym samym skuteczniejszej inhalacji, sprzyja przewiewne ubranie.

Zalecana dawka:

- dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 łyżeczkę maści nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 4 razy na dobę
- dzieci w wieku od 5 do 12 lat: 1/2 łyżeczki maści nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 3 razy na dobę

VICKS VAPORUB maść - przeciwwskazania:

- uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- czynna astma oskrzelowa i inne choroby dróg oddechowych oraz nadwrażliwość dróg oddechowych
- wiek poniżej 5 lat
- nie stosować na uszkodzoną skórę, skaleczenia i błony śluzowe

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.