

VIGANTOL witamina D3 w kroplach, 10 ml



cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	krople
Producent	MERCK
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	uzupełnienie witaminy D3

Opis produktu

VIGANTOL witamina D3 w kroplach - działanie:

lek zawiera substancję czynną witaminę D (cholekalcyferol) ważną w procesie tworzenia kości. Witamina D3 (cholekalcyferol) jest fizjologicznie wytwarzana w skórze pod wpływem ekspozycji na promieniowanie UV, może być też dostarczana do organizmu z pokarmem. W niedoborach witaminy D występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).

VIGANTOL witamina D3 w kroplach - wskazania:

- w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
- w zapobieganiu krzywicy u wcześniaków
- w zapobieganiu schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych
- w zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych
- w leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych

VIGANTOL witamina D3 w kroplach - skład:

substancją czynną leku jest cholekalcyferol; pozostałe składniki to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

VIGANTOL witamina D3 w kroplach - dawkowanie:

- wcześniaki: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (1000 IU witaminy D3). Po osiągnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.
- noworodki i niemowlęta (do 12 miesięcy): 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D)

U wcześniaków, noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

- dzieci, młodzież, dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D)
- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D)

VIGANTOL witamina D3 w kroplach - przeciwwskazania:

- uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia w krwi) lub hiperkalcynuria (nadmierne wydalania wapnia z moczem)
- kamicę nerkową lub ciężką niewydolność nerek
- rzekoma niedoczynność przytarczyc

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.