

# VOLTAREN EXPRESS FORTE 25 mg, 20 kapsułek

cena: 20,99 PLN



## Opis słownikowy

Główny składnik	diklofenak
Postać	kapsułki
Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwzapalne

## Opis produktu

### VOLTAREN EXPRESS FORTE 25 mg - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne

### VOLTAREN EXPRESS FORTE 25 mg - wskazania:

w bólach mięśni, bólach reumatycznych, ostrym bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bólu głowy, bólu zębów, bolesnym miesiączkowaniu; leczenie objawów grypy i przeziębienia (ból ogólny, gorączka), bólu gardła

### VOLTAREN EXPRESS FORTE 25 mg - skład:

1 kapsułka zawiera 25 mg diklofenaku potasowego; pozostałe składniki: makrogol 600, glicerol 85%, woda oczyszczona; skład kapsułki: żelatyna, glicerol 85%, polisorb 85/70/00 (D-sorbitol+1,4-sorbitan z mannitolem), żółcień chinolinowa 70% (E 104)

### VOLTAREN EXPRESS FORTE 25 mg - dawkowanie:

dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat - początkowo 1 kapsułka. Dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Nie należy stosować więcej niż 3 kapsułki w ciągu doby. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. W celu osiągnięcia największej skuteczności leku, kapsułek nie należy zażywać podczas lub bezpośrednio po posiłku.

### VOLTAREN EXPRESS FORTE 25 mg - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego; występujące w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub

perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ); czynna lub występująca w przeszłości nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (wystąpienie dwóch lub więcej odrębnych przypadków potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); trzeci trymestr ciąży; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i (lub) choroba naczyń mózgowych; nie stosować u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn może być przyczyną wystąpienia napadu astmy, pokrzywki lub ostrego nieżytu błony śluzowej nosa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.