


XENNA FAST, 6 mikrowlewek po 10 g



cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	mikrowlewki
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	wyrób medyczny
Zastosowanie	zaparcia

Opis produktu

Wyrób medyczny XENNA FAST stosuje się na zaparcia. Zmniejsza on dyskomfort i przeciwdziała podrażnieniom spowodowanym zaparciem. Przyciąga wodę do stolca, przez co zmiękcza masy kałowe, ułatwiając wypróżnienie. Kompleks Propolax, w skład którego wchodzi kompleks monosacharydów z białych winogron i polisacharydów z aloesu i prawoślazu, wzbogacony o hydroglicerynowy wyciąg z propolisu. Mają one działanie nawilżające i zmiękcżające. Do tego wykazują działanie śluzopodobne, dzięki czemu masy kałowe łatwiej przechodzą. W Propolaxie znajdują się także alkohole wielowodorotlenowe i węglowodany, które dzięki osmotycznym właściwościom sprawiają, że wypróżnianie jest łatwiejsze. Propolis hydroglicerynowy chroni śródbłonek błony śluzowej odbytnicy, dzięki czemu wypróżnianie może być mniej bolesne.

XENNA FAST - działanie:

przeczyszczające, łagodzące, ochronne na błonę śluzową odbytnicy

XENNA FAST - wskazania:

zaparcia; dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia

XENNA FAST - skład:

dejonizowany koncentrat moszczu winogronowego, sorbitol, woda, wyciąg z malwy, żel aloesowy, płynny wyciąg z prawoślazu, hydroglicerynowy wyciąg z propolisu; substancja pomocnicze: substancje konserwujące benzoesan sodu, sorbinian potasu

XENNA FAST - sposób użycia:

stosować doodbytniczo. Mikrowlewki są dokładnie zamknięte w szczelnym, gotowym do użycia opakowaniu, w celu ułatwienia ich użycia oraz zapewnienia higieny z tym związanej. Należy wyjąć jedną mikrowlewkę, zdjąć osłonkę z pojemnika, posmarować aplikator kroplą roztworu i wprowadzić do odbytu. Następnie wyciska się cały roztwór z pojemnika. Wyjmując aplikator z odbytu należy cały czas

trzymać pojemnik ściśnięty. Należy stosować jedną mikrowlewkę w przypadku zaparc. Jeśli zaparcia są uciążliwe, po zastosowaniu jednej mikrowlewki, po 10 minutach należy wprowadzić kolejną.

XENNA FAST - przeciwwskazania:

- nadwrażliwość lub uczulenie na jeden ze składników produktu
- ostre bóle brzucha lub bóle niewiadomego pochodzenia